常规甘油封片剂

产品简介:

常规甘油片剂是一种用于常规封固剂，亦可用于减缓荧光淬灭的封固，主要由甘油组成，对于减缓荧光淬灭，其效果不如抗荧光淬灭封片剂 (Antifade Mounting Medium)，按每个样本需要 50 ~ 100μl 封片剂计算， 5ml 可以用于至少 50 样本的封片。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

编号 / 名称	GCIH0272	GCIH0272	Storage
常规甘油封片剂	10ml	50ml	RT
使用说明书	1 份		

自备材料:

1 、 载玻片

2 、 盖玻片

3 、 荧光显微镜

操作步骤(仅供参考):

1 、贴壁细胞样本

① 染色完成后，吸去染色液。

② 滴 1 滴甘常规甘油封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。

③ 在显微镜下观察。

2 、组织切片

① 染色完成后，吸去染色液。

② 滴 1 滴常规甘油封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。

③ 在显微镜下观察组织切片。

3 、其它样品

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项:

1、荧光物质均易发生淬灭，染色后的样品宜避光保存。

2、在使用常规甘油封片剂的情况下，虽然可减缓淬灭，仍需尽量避光。

3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCDH0005	Mayer 苏木素染色液
GCIH0091	多聚赖氨酸溶液 (10×PLL,1mg/ml)
GCIH0142	PBS 磷酸盐缓冲液 (0.01mol/L,pH7.2-7.4)
GCIH0270	甘油明胶封固液
GCIH0305	柠檬酸钠抗原修复液 (50×)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液 (碱性)
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒 (GOD-POD 比色法)
GCTC1213	总胆固醇 (TC) 检测试剂盒 (COD-PAP 单试剂比色法)

