北京沃凯生物科技有限公司
全国免费电话:400-819-385
www. bjoka- vip. com
Tel:010-62971590. Fax:62340519
M-ail:postmaster@oka-vip.com

Denhardt's 溶液 (50×)

产品简介:

封闭剂防止配体黏附于表面，在分子生物学中使用封闭剂可阻止在 DNA 印迹、 RN 印迹、蛋白质印迹中的非特异性结合。核酸杂交中常用的封闭剂有 Denhardt's 溶液和 BLOTTO 溶液，大多数情况下带有目的分子的滤膜通常在加入探针前，先与封闭剂温育 1 ~ 2h ，背景杂交会被抑制。

Denhardt's 溶液 (50×) 由 Ficoll 400 、 PVP 、 BSA 等组成，经无菌处理，主要用于 RNA 杂交、单拷贝序列的 DNA 杂交、 DNA 固定在尼龙膜上的杂交。 该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	GCNH0008	Storage
Denhardt's 溶液 (50×)	50ml	-20℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1 、根据实验具体要求操作或稀释于杂交缓冲液 (通常是含有 SDS 、变性鲑鱼精 DNA 的 SSC) 中。

注意事项:

1 、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用，避免反复冻融。

2 、注意无菌操作。

3 、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

4 、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。低温运输， -20℃ 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
GCDN0001	甲基绿 - 派络宁染色液
GCNR0001	DEPC 处理水 (0.1%)
GCNR0040	RNase A(10mg/ml)
GCOR0001	pH 标准缓冲溶液 (pH=4.00)
GCPW0053	Western 抗体洗脱液 (碱性)
GCTC0713	葡萄糖检测试剂盒 (GOD-POD 比色法)